

卷二十婦人門

經病

崩漏

帶下

卷二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

Dr. Saiki's Library.

函或架
之番番
冊號號

冊之番號

備

考

4444

京都產院文庫藏書

丹溪心法附餘卷二十

婦人門

經病九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也四物加參朮帶痰加南星半夏陳皮
之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃連 過期紫黑
有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過期淡色來者痰
多也二陳加川芎當歸 過期而來是血虛宜補血用四物加
黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是氣血俱熱宜涼氣血柴胡
黃芩當歸白芍生芩香附之屬 經不調而血水淡曰宜補氣
血參芪芎歸香附白芍腹痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而



辛集

作痛者乃虛中有熱所以作疼

經水將來作疼者血實也一

云氣滯四物加桃仁黃連香附

臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯

有瘀血宜四物加紅花桃仁莪朮玄胡索香附木香發熱加黃

芩柴胡 紫色成塊者熱也四物加黃連柴胡之類

痰多占

住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼朮川

芎香附作丸子服之

肥人不及日

數而多者痰多血虛有熱

亦用前丸藥中更加黃連白朮丸服

血枯經閉者四物加桃

仁紅花軀脂滿經閉者以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥

崩故也如用以姜汁炒

肥胖飲食過度之人而經水不調者

乃是濕痰宜蒼朮半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸臨經來

時肚痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹甘草痛甚者豆淋酒痛

緩者童便煮莎人炒條芩末為丸 經水去多不能住者以三
補丸加莎根龜板金毛狗脊 陰虛經脉久不通小便澁身軀
疼痛四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用蒼莎丸加蒼耳酒芍
藥為丸就煎前藥吞下

入方 治經水過多

黃芩

炒

白芍

炒

龜板

炙洛一兩

黃柏

炒三錢

椿根白皮

七錢半

香附子

二錢半

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十丸

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子

一兩

黃連

半兩

吳茱萸

十粒

桃仁

五十

紅麴

二錢

砂仁

三兩

麻相木

右爲末生姜汁化炊餅爲丸梧子大空心服一百丸

又方治一切瘀血爲痛

香附四兩醋煮 瓦礫子煨一二兩醋煮一夜 桃仁二兩

牡丹皮 大黃蒸熟 當歸各一兩 川芎

紅花各半兩

右爲末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十九丸

導痰湯 見痰類

三補丸 見補損

倉莎丸 見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯

治衝任虛損月水不調臍腹疔痛

當歸

川芎

芍藥

熟芋

等分

右以水煎服加減于後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脈微數本方

去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分經候過多本方去

熟芋加生芋或只加黃芩白朮經行身熱脈數頭昏本方

加柴胡芍藥經行數少或脹或痛四肢疼痛加延胡沒藥白

芷與本方等淡醋湯調下末子經候不調心腹疔痛只用

芍藥二味名君臣散氣冲經脈故月事頻併臍下多痛加

芍藥經欲行臍腹絞痛加玄胡楨榔苦練炒木香減半

經水澁少加葵花紅花經水適來適斷或有往來寒熱先

宜服小柴胡湯後以四物和之

經後過而作痛血氣俱虛

也宜本方對四君子湯服之

大溫經湯

和劑方

治衝任虛損月候不調或來多不已或過期

不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱

阿膠

碎炒

芎藭

當歸

去蘆

人參

去蘆

肉桂

去皮

甘草

炒

芍藥

牡丹皮

各二兩

半夏

二兩半

吳茱萸

二兩各湯洗七次

麥門冬

去心五兩半

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹

和劑方

治婦人血海虛冷久無孕育及數

墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸証

秦艽二兩

京墨假醋淬研一兩

糯米炒一斗

川芎一兩半熟地黃酒蒸四兩

茯苓去皮三兩

人參去芦二兩石斛去根酒浸二兩

蒼朮米泔浸去粗

皮八兩

香附炒去毛四兩

木香炮一兩

藁本去芦二兩當歸去芦酒浸一兩五錢肉桂去粗皮一兩半

乾姜炮二兩半山藥七錢半澤蘭葉四兩川椒去目炒七錢半

細辛去苗葉一兩半

桔梗炒二兩桃仁去皮尖一兩炒

大豆黃卷炒半斤

甘草炙二兩蚕布燒灰二兩

牡丹皮一兩半

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可

交加地黄丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生芩一斤 老生姜一斤 玄胡索 當歸

川芎 白芍藥 各二兩 沒藥 木香 各一兩

桃仁 去皮尖人參 各一兩半 香附子 半斤

右將地黄生薑各搗汁以生薑汁浸地黄粗地黃汁浸生薑粗皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾同為末醋糊丸如梧桐子大空心服五十九丸姜湯下

內炙散和劑方治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟乾地黃 洗焙肉桂 去皮各一兩半

甘草炙 當歸 去芦洗 白朮 山藥

白芷各八兩 茴香一兩 半藥本

乾姜炮

川芎

黃芪去苗各二兩

木香一兩

陳皮去白各兩 白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心執服溫酒調下亦可如症後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生姜煎

活血散御藥院方治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

當歸

川芎

白芍藥

玄胡索各四兩

肉桂去皮一兩

右咬咀每四錢水一盞煎至七分食後熱服

溫經湯大全良方治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

義木各半兩人參

甘草

牛膝各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心筋漏帶下便血殺瘕並皆服之

大香附丸盆擦去皮以米醋浸半日用瓦銚慢火煮令醋

盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧子口乾每服五十丸淡醋湯下

一方香附子一斤洗淨四兩當歸二兩製如前法治証同

名艾附丸

如聖丹聖惠方治婦人經脈不調赤白帶下

枯礬四兩 蛇床子二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中用熱極再換

增損四物湯宣明方治月經不調心腹疼痛補血養經注顏

川芎

芍藥

當歸

熟地黃

白朮

牡丹皮各五錢

地骨皮一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎至一盞去滓通口服食前

冊參散大金良方治婦人經脈不調或前或後或多或少產前

胎不安產後惡血不下並治之煎治寒熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參去芦不以多少

右為不每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散大全良方治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸物

桃仁

甘草

半夏各一兩赤芍藥

生地黃各二兩澤蘭

牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎各一兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分空心服

四製醋附丸端竹堂方治婦人女子經候不調

香附子去毛一斤作四分

一分好酒浸七日

一分小便浸七日

一分鹽水浸七日

一分米醋浸七日各焙乾

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前鹽酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各一兩

○廣搜香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

熟地各半兩

牡丹皮

玄胡各二錢半人參

黃芪各一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯送下

○廣按月信趙前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脈不行多有脾胃損傷而致者不可使認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪升麻陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散和劑方治婦人血虛竭經候不調或斷續不來
或積瘀塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草五兩當歸去芦 牛膝酒浸各兩內桂去芦

紅花 白芷各二兩半甘草炙二兩赤芍藥一兩

紫葳即凌霄花 蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒調下
通經九濟生方治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒炒去汗蓬朮炒去烟乾漆炒去烟當歸去芦

青皮去白 乾姜炒 大黃炒 桃仁炒

紅花 桂心各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之

九如梧桐子陰乾每服五十丸醋湯溫酒空心下

千金挑仁煎簡陽方治婦人血積癥瘕月水不行等疾

挑仁去尖燒少朴硝

大黃各二兩蜜中半兩炒令黑色

右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以挑

仁大黃蜜中末入內不住手攪度可圓時却下朴硝更不住

攪良久出再丸如梧桐子五更初溫酒下五丸至日午取下

如赤豆汁雞肝蝦蟇各樣以盡為度

六合湯濟生方治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸

白芍藥

官桂去皮

熟地黃酒洗

川芎

蓬朮炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散

治婦人月水不行發熱腹脹

當歸 酒浸

凌霄花

劉寄奴

官桂

去皮

紅花

酒浸候煎藥一二沸即入

牡丹皮

酒洗

川白芷

赤芍藥

延胡索

各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散

張子和方

四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服

四物湯見補損承氣湯見傷寒

三和湯

張子和方

四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

涼膈散見溫熱

一方一治室女月經不通

紫葳

一兩

乾漆

炒二錢半

芍藥

蓬莪朮

當歸稍各半兩

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝六錢

大黃

細辛

桃仁去皮尖雙仁伍錢炒

川芎

當歸

水蛭三錢糯米炒

右為末煉蜜丸梧子大每服二十九空心酒下

通經散聖惠方

治室女月水不通

雄鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸聖惠方

治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

甘草炒

官桂

桃仁炒一兩

大黃二兩

血竭二錢半

紅花 少許

地膽 二十箇
去翅足

右爲末煉蜜九梧子大每服三十丸空心溫酒下量虛實加

服之

溫經湯 大全良方

若經道不行遠膈寒疝痛徹其脉沉緊此由

寒氣客於血室血凝不行又爲氣所衝新氣與故血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮

各半兩

人參

甘草

牛膝

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯

大全良方

官桂

芍藥

生地黄各二兩

甘草一兩

桃仁去皮尖
五十箇

右咬咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓

溫服

當歸散大全良方治血脉不通

當歸

川山甲灰焙

蒲黃炒各五銖

辰砂一錢

麝香少許

右為末研倅每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散經驗方

治心隔迷悶腹臍撮痛氣急痞塞月信不通等

疾

烏藥二兩

當歸

蓬莪木各一兩

右為細末每服二錢溫酒調服後以食厭芝大忌生冷油膩等物產後諸疾用炒姜湯下

萬病丸按率方治女人月經淋瀝月候不來或崩漏寒疝痛徹及產後血氣不調腹中生瘕結而不散等疾

乾漆碎炒令烟盡須清白如此一特

牛膝去苗用酒浸一宿焙乾各一兩

右剉為細末用生地黄汁一升入前二味於銀石器內用慢火熬候可為丸如梧桐子大每旦空心服二丸或未飲溫酒

任下

通經散楊氏方治衛任不調經脉閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不効者正宜服之

斑蝥去翅足炒

蜜虫

水蛭炙炒黑各四

十枚

杜牛膝半兩當歸

紅花各三錢

滑石一錢半

石到為細末每服一錢用桃仁七箇研細末用溫酒調下食前服

○廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯者此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶求千金於乞丐也

瑞金散大全良方治婦人血氣最弱月經不行預先嘔吐疼痛

片姜黃四兩牡丹皮

蓬莪朮

紅花

當歸

赤芍藥

川芎

延胡索

官桂各一刃半

右吹咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服

方 治經候閉塞亦治乾血氣

斑猶二十箇糯米妙

桃仁五十箇亦妙

大黃錦紋者半刃

右爲細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒服五九壯者十九丸如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏一治乾血氣

用錦紋大黃酒浸乾四兩爲末以好醋一升熬成膏丸如雞彈大每服一九熱酒化開待溫臨卧服大便利一二行紅脉自下此藥調經水之仙藥也

又方加香附

千金散 治經候不通

蒲蓄

瞿麥各四升 檳榔

麥蘖

小茴香各三升 大黃 錦文者六升

右為細末每服三錢臨卧溫酒調下

○經病疼痛

六烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育不成

崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食無味身疼羸瘦而目痠
黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮鬢黃落甚卧倦起產後
惡血上行心腹刺痛敗血不止及子宮一切惡疾

大艾葉

當歸醋炒

破故紙炒

茴香炒

熟地黄醋炒南木香不見火吳茱萸

三稜

義木各二兩川芎醋炒

芍藥醋炒各三兩

香附子

六兩延胡索一兩

紫荊皮四兩醋炒

右先將艾二兩香附子六兩米醋一升浸一日一夜冬月三晝夜煮乾炒令赤黑色入後十二味同為末米醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十丸空心鹽酒湯任下日二服如崩中下血不止加棕灰一兩綿灰五錢蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯濟生方治婦人室女七情所感血氣相併心腹疼痛或連腰脇其作搐搦但是一切血氣經候不調皆治有效

當歸去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥

片子姜黃

官桂

不見火各半兩

乳香

木香不見火各三兩

井草一兩半女藥三錢

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服吐

逆加半兩各半兩

號珀散濟生方治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆攻心

眩暈不省並皆治之

劉寄奴去便牡丹皮去木熟地黃酒浸玄胡索炒去皮

烏藥

赤芍藥

蓬義木

京三稜

當歸去蘆酒浸官桂不見火各一兩

一方有菊花蒲黃炒各一兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛

為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫酒送下
三神丸濟生方治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調

橘紅二兩玄胡索去皮醋煮當歸去蘆酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心艾醋湯
當歸煎丸大全良方治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏力月
候不調

當歸三兩別研末 檳榔 赤芍藥 牡丹皮

玄胡索各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子大每服二十九酒下
姜黃散大全良方治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃四兩蓬莪朮 紅花 官桂

川芎各一兩玄胡索 牡丹皮 當歸各二兩

白芍藥三兩

右咬咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口服食前

痛散大全良方治婦人血氣刺痛

荔枝核燒存性五升 香附子炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散拔萃方治婦人月水不利脘腹疼痛不飲飲食

牡丹皮 川黃連炒各一兩 赤茯苓

生地黃 桃仁 當歸 官桂

赤芍藥 白朮 石常去皮 木香各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通口服食

前服

牛膝散按翠方治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩 官桂

赤芍藥

桃仁

玄胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香各七升半

右為細末每服三錢溫酒調下食前

替灸丸秘方治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不通面色
痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息此藥常服溫中暖臍調
經有子服藥末盡即時有效

茯苓

艾葉各八兩 香附子

常歸各四兩

吳茱萸

炒三兩

川芎

白芍藥各二兩

右用陳醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子每服五
十九空心午前日二服用醋湯送下

大延胡索散宣明方治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘
悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平心胃急痛尤宜服之

玄胡索 當歸 赤芍藥 京三稜煨

川練子去核 蓬朮 官桂去皮 厚朴製

木香 川芎各一各一各一各一 桔梗 黃芩

大黃各五各一各一各一 甘草一兩 檳榔二錢

右為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三服如
惡物多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各三各
延胡索散大全良方治婦人止氣攻心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

官桂各七錢半

木香

枳殼

赤芍藥

桃仁各五錢

熟地黃一兩

右以咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓通口食前服

當歸散大全良方治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力

不能食

當歸酒炒

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

玄胡索

右等分爲末熟酒調下二錢不拘時候

失笑散和劑方治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂

蒲黃各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七分熟服

異方劑陰丹 秘方 治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛

香附子

三稜

莪朮

陳皮 去白

青皮

敗姜 各一兩

右用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋打糊

官桂

當歸

赤芍藥

白芍藥

生地黄

熟地黄

澤瀉

片姜黃

牡丹皮

乾姜

川姜

劉寄奴

澤蘭

人參

蒲黃 紙炒

木香

白朮

玄胡索

右各一兩焙乾與前藥爲末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下脾疼姜湯下或酒下

○經病發熱

逍遙散

和劑方

治血虛煩熱月水不調癰腹脹痛痰嗽潮熱

甘草

炙半兩

當歸

去笋炒

茯苓

去皮

芍藥

白朮

柴胡

去前各一兩

右咬咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎至七分溫

服

人參荆芥散

和劑方

治婦人血風發熱身體痛疼頭昏目澁煩

渴盜汗或月水不調癰腹疼痛癰塊硬等症

丹溪心法附錄 卷之三

赤芍藥

五兩

柴胡

去苗土 兩半

牡丹皮

五兩

荊芥穗

酸棗仁

醋浸去 乾炙黃

生乾地黄

人參

去蘆

白朮

枳殼

去穰 炙炒

肉桂

去皮各 七錢半

防風

去蘆

當歸

芍藥

甘草

各五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘時

油煎散

和劑方

治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澀

五加皮

壯丹皮

赤芍藥

當歸

去蘆各

右為末每服一錢水一盞青銅錢一文煎油入前項藥同煎

七分煎不得攪喫不得吹常服此藥能肥婦人

滋血陽

和劑方

治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮

腫肌體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草

荊芥穗各四

牡丹皮一兩赤芍藥

枳殼

炒去白麩

肉桂去皮

當歸

去芦炒川芎各二兩

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一個煎服以經調為度

牡丹散和劑方治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌体羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心

牡丹皮

芍藥

延胡索炒

沒藥別研

陳皮去白各一兩

真蓬莪朮

鬼箭各二錢半紅花

當歸去芦各二兩

乾漆炒半兩蘇木二錢半

甘草

烏藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時

加味四物湯

治衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘵狀

當歸

地黃

芍藥

川芎各一兩

柴胡半兩

黃芩二錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯 濟寮方治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生姜五片煎八分溫服

四物湯

見前

參蘇飲

元胃寒

麥煎散 聖惠方治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胸

鱉甲醋炙

大黃煨

常山

赤茯苓

柴胡

白芍藥

當歸

乾漆炒烟淨

生地黃

石膏各一兩甘草半兩

石咬咀每服一兩水一鍾小麥五十粒煎至一鍾去滓溫服

食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭肌熱盜汗
黃芪散大全良方治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲
飲食

人參

黃芩

當歸

各七半

柴胡一兩半

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黃

赤芍藥各一兩甘草二兩半

右咬咀每服一兩水二鍾生姜五片煎至一鍾食前服

麥門冬散大全良方治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬

前胡

赤茯苓

各一兩

羚羊角

赤芍藥

桑白皮

黃芪

各七半

生地黃

甘草各五兩

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎一鍾通口服
犀角散按方治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草各五升柴胡

黃芪一兩半麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓各七升半

右咬咀每服五錢水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓通口服
不拘時候 一方有生地黃七升半

地骨皮散太全良方治婦人血風氣体虛發渴寒熱

柴胡

地骨皮

各一

桑白皮

枳殼

前胡

黃芪

各七升半

雪白茯苓

五加皮

人參

甘草

官桂

白芍藥各五升

右以咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾通口服
柴胡散大全良方治婦人寒熱瘦肢節疼痛口乾心煩不欲
飲食

北柴胡

黃芩

赤茯苓

白朮各一兩

人參

地骨皮

枳殼制

生地黄

桔梗

桑白皮

赤芍藥各七錢半

驚風醋炙二兩麥門冬三兩甘草五錢

右以咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至七分溫服

小柴胡湯大全良方治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時

經水適斷此為熱入血室也血必結故如瘕狀

柴胡八錢

半夏二錢

人參

甘草

黃芩

生地黃各三寸麥門冬二寸

右咬咀每服八錢水一鍾干姜五片棗二枚煎至八分去滓溫服

柴胡飲子宣明方治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來肺痿

喘嗽婦人餘疾產後經痛

柴胡

人參

黃芩

甘草

當歸

芍藥

大黃各一兩

喘嗽者加半夏桔梗五味子各五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓溫服食後

柴胡四物湯治婦人日久虛勞微有寒熱脉沉而訕

川芎

熟地黃

當歸

芍藥各一兩半

柴胡八分

人參

黃芩

甘草

半夏麴各三升

右每服一兩水一盞半生薑三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前痛為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因

憂思忿怒外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱結不行之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不尽此經候不調通作痛發熱之所由也調其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱治之有道也坎抑營論之氣行血行氣止血止故治血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也

崩漏九十三

辛集

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言熱主在寒孝者宜尋思之
則治其標用白芷湯調百草霜其甚者用棕櫚灰後用四物湯急

加炒乾薑調理 因勞者用參芪帶升補藥 因寒者用乾薑

因熱者用黃芩 崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱

蓋五靈脂能行能止 紫色成塊者熱以四物湯加黃連之類

婦人血崩用香附白芷丸服 氣虛血虛者皆以四物湯加

參芪 漏下乃熱而虛四物湯加黃連 崩中白帶用椒目末

又用白芷石灰炒去灰為末茜草少許粥丸服 一方用生狗

頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服 一方五靈脂半生半炒

為末酒調服 經血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服効

夫婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也二脈

為經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適經下

依時若勞傷過度臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故

忽然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之藥舉養脾胃微
加鎮降心火之藥治其心補明瀉陽經自止矣

附諸方

膠艾湯和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及
姙娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠

考窮

甘草炙各三兩艾葉炒各二兩

熟乾地黄

白芍藥各四兩當歸去方炒二兩

右以咀每服三錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

伏龍肝散和劑方治血氣勞傷衝任虛經血非時注下或如

豆汁或成血片或五色相雜脘腹冷痛經久不止

川芎三兩

肉桂去皮五錢當歸去方乾姜炮各七錢

赤石脂 一兩 艾葉炒 三兩 熟地黃

甘草炙半兩

麥門冬 一兩 伏龍肝 一兩 即鍋心土

右咬咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前溫服

神仙聚宝丹和劑方治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥

琥珀各別研二兩辰砂別研一錢木香煨末一錢

乳香別研錢半當歸洗焙取末一兩

射香別研一兩

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一丸溫酒磨

下如一切雜症及產後敗血衝心惡露未盡並入童子小便

艾煎丸 治崩傷淋瀝不已小腹滿痛常服益氣調經

食萊更湯洗當歸各七錢半

熟地黃

白芍藥各一兩半

石菖蒲炒 川芎

人參

熟艾 四兩 熟米飲調作餅焙

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸酒飲任下

鎮宮丸 治生方治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血脐腹脹痛頭暈目眩

代赭石

紫石英煅醋汁

禹餘糧煅醋淬七次

川芎

陽起石煅紅研

鹿茸火去毛醋蒸焙

蒲黃炒

香附子醋炙各一兩當歸去芦酒浸各一兩

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

補腎仁湯 治生方治婦人憂思過度勞傷心經不能載血遂致

崩中下血不止

鹿茸火去毛酒蒸焙栢子仁炒各一兩 芎藭一兩

香附子炒去毛二兩當歸一兩甘草炙半兩川續斷一兩半

茯神去木一兩 小草一兩阿膠一兩炒成珠

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分空心溫服

一方 治婦人血崩屢驗

當歸

白芍藥

棕櫚

乾姜

右等分各燒存性為末醋湯調以有節朱筋左攪四十九轉

食前服

一方 治月水不止

用阿膠炒枯為末用好酒空心調服艾湯亦可

一方

艾葉如雞子大阿膠半兩 乾姜一升

右為粗末用水五鍾先煮艾姜後入膠洋消分作二服空心
鹿茸丸大全良方治衝任虛損以致經候過多又為風冷所乘
尺脈微細甚者可灸關元百壯

鹿茸火去毛醋炙煮

赤石脂

禹餘糧各一兩

艾葉

栢葉

附子炮去皮脂各半兩

熟地黃洗焙當歸酒浸

續斷各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

○廣按此方用附子的係虛寒者方可然崩症多屬虛熱其
虛寒者容或有之或當老年崩久與大寒冷所乘不可一

緊作虛熱論也

○已上數方補虛溫寒之劑

涼血地黃湯 拔萃方 治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守包絡相火故血走而崩也

生地黃

當歸各五分 黃連

黃蘗

知母

藁本

川芎

升麻各二分

柴胡

羌活

防風各二分 黃芩

甘草炙

細辛

荆芥

蔓荊子各一分

紅花少許

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

金華散簡易方 治婦人經血得熱崩漏不止

延胡索

當歸

瞿麥

牡丹皮

威靈仙各七多半

乾葛五多

蒲黃五錢

石膏二兩

桂心三分

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎七分食前溫服

黃芩湯簡易方治崩中下血今人多用止血補血之藥少能見効此是陽乘陰則經水沸溢宜清之為愈

黃芩研為細末燒秤鍾淬酒調下三錢食前服

一方治婦人血崩不止

槐花一兩

棕毛灰五多

右為末水二鍾鹽少許煎至七分去滓溫服

如神散聖惠方治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥

各等分為末鹽一捻水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

當歸龍骨丸宣明方治月事失常經水過多及帶下淋瀝無期
久新赤白諸証并產後惡物不止或孕婦胎動不安疼痛漏
下及大人小兒下痢並宜服之

當歸 為藥 黃連 染槐子

艾葉炒 茯苓各五錢 虎骨 黃柏各一兩

木香二錢半

右為末滴水丸如小豆大每服五十丸食前米飲送下

聖藥四物湯 治婦人經脈不住或如豆汁五色相雜面色痿

黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止並宜服之

黃連

黃柏

黃芩

山梔子

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各一錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

柏黃散永類金方療經血不止

黃芩一兩一錢半

當歸

柏葉

蒲黃各一兩

生薑半兩艾葉二錢五分

生地黄兩半伏龍肝二兩

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

芩心丸瑞竹治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過

多不止

黃芩新枝條者二兩裏以米醋浸七日乾又浸又炙如此者七次

右為末醋糊丸如梧子大每服七十九空心溫酒下日三服

黃藥子散宜明方治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困
不美飲食

黃藥子

當歸

芍藥

生地黄

人參

白朮

知母

石膏各一錢

川芎

桔梗

甘草

紫苑

柴胡

槐花子各二分半

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

小蘇湯 治崩中不止

小蘇葉研取汁一鍾

生芩汁一盞白朮半兩

右三件入水一鍾煎溫服

奇效四物湯聖惠方治血崩

四物湯

艾葉

阿膠炒

黃芩

右等分水二盞生薑三片煎至一鍾去滓空心食前溫服
廣按此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補而此方補
虛中又兼退熱也崩証虛而有熱者用此方與黃藥子散
最當

○已上數方涼血清熱之劑

如聖散經驗方治婦人血崩

棕櫚

烏梅各一兩乾姜一兩半並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅湯酒空心調下久患三服愈

十灰丸濟生方治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮蓬灰

油髮灰

棕櫚灰

赤粉皮灰

綿灰

各等分

右為末用醋煮糯米丸如梧桐子每服一百丸米飲下

荊芥散大全良方治婦人崩中連日不止

用荊芥穗以燈盞多着灯心好麻油點灯就上燒荊芥焦色為末每服三錢童子小便調下

獨聖散太全良方治婦人血崩不止

用防風去芎義隨多少為末酒煮麴清調下二錢空心日二服更以麴作糊酒投之極驗

當歸散聖惠方治婦人血崩不止

當歸

龍骨

燒赤

香附子炒各一兩

棕毛灰五斤

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚雞等物

一方大全良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方大全良方

用棕櫚燒存性為末湯泡酒令淡調下三錢空心服

一方大全良方

用棕櫚白礬煨為末湯泡酒令服三錢

必効散保真集方治婦人月水經不調及崩漏不止

棕皮燒

木賊去節燒灰存性各二兩射香一錢研

右為末酒調二錢空心服

備金散

治婦人血崩不止

香附子四兩炒

當歸一兩二錢

五靈脂一兩

右為細末每服五錢空心以醋湯調下立効

蓮蓬散 治經血不止

用蓮蓬燒灰存性為細末每服二錢調下

一方 治血崩

當歸

乾姜

烏梅

青木綿

棕櫚各等分

右並燒存性為細末燒秤銚淬酒空心調服日三次

○已上數方止血住崩之劑

○黃按血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋今之七情過極則動五志之火五志之火亢甚則經血暴下失期

而求久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則孤子之陽無以立故本末勿遺前後罔紊方可言治也

帶下九十四

辛集

丹溪心法

○帶下

赤屬血

白屬氣

主治燥濕為先

渴與帶俱見

胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升提甚者上必用是
以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮仍用九子一本作瓦礫子
又云赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分 肥人多是滋痰

海石半夏南星炒栢蒼木川芎椿皮 一方無椿皮有青黛

瘦人白帶少如有者多熱以炒黃栢滑石椿皮川芎海石如無

海石以蛤粉亦可 一方有青黛作丸子服 赤白帶下炒黃

荆子爲末酒調下二錢或米湯亦可 又治心痛羅先生法或

十棗湯或神佑丸或玉燭散皆可服實者可行虛者不可峻攻

血虛者加減四物湯 氣虛者參朮陳皮間與之 濕勝者

用固腸丸 相火動者於諸藥中少加黃栢 滑者加龍骨赤

石脂 滯者加葵花 葵花白者治白帶赤者治赤帶 性燥者加

黃連 痰氣帶下者蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓丸服寒月

少加乾姜臨機應變必須斷厚味

大方

本草綱目卷之十

三十

良姜

芍藥

黃柏

各二錢俱炒成灰

椿白皮

一兩半

右為末粥丸梧子大每服四五十九空心

又方

一婦人白帶兼風痛

半夏

茯苓

川芎

陳皮

甘草

蒼朮

黃柏

酒炒

南星

牛膝

酒洗

右為末水煎服愈

一方

治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星

蒼朮

栢皮

炒

滑石

半夏

川芎

辛夷

牡蠣粉

炒

酒琴

右咬咀水煎去粗食前服

又方 治白帶下

龜板

炙

枳子

各二兩

黃栢

炒一兩

白芍藥

七錢半

香附

半兩

乾姜

炒二錢半

山茱萸

苦參

椿根皮

各半兩

貝母

右爲末酒糊丸梧桐子大空心米湯下五十丸

又方 治赤白帶下或時腹痛

龜板

酒炙三兩

黃栢

炒一兩

乾姜

炒一錢

枳子

二錢半

右爲末酒糊丸梧子大每服七十丸日服二次

又方 治婦人有孕白帶

丹溪心法附錄 卷之十一

蒼朮 三錢

白芷 二錢

黃連 炒二錢

黃芩 炒三錢

黃柏 炒一錢半

白芍 二錢半

椿根皮 炒一錢半

山茱萸 二錢半

右為末糊丸空心溫酒下五十丸

治結痰白帶 先以小胃丹半飢半飽津液下數丸候鬱積開

却宜服補藥

白朮 二兩

黃芩 半兩

紅白葵花 二錢半

白芍 七錢半

右為末蒸餅丸空心煎四物湯三五丸

固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾 用此

以燥其濕亦不可單用須看病作湯使

椿根白皮 性涼而燥須炒用

石為末酒糊丸服

又方

椿根皮四兩滑石二兩

右為末粥丸梧子大空心湯下一百丸

又方

治白帶因七情所傷而脉數者

黃連炒

鹽栢酒蒸黃栢炒各半兩

香附醋炒

白芍

白朮各二兩椿根皮炒二兩

白芷燒存性三兩

右為末粥丸梧子大每服七十丸食前米飲下

又方

治赤白帶溫勝而下者

蒼朮鹽炒白芍

滑石炒各一兩

甘草各三兩

枳殼炒

椿根皮炒一兩

乾姜炮三兩地榆半兩

右為末粥。空心米飲下。一百丸。

附諸方

補宮丸楊氏方治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸崩中帶下並宜服之

鹿角霜

白依令

香泉正

泉

金匱要略

白微

白芍藥

壯陽燄

山藥各等分

右為木麩糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲送下

內金蓮茸丸楊氏方治婦人火傷血脈
凝結受寒小便白濁盡

夜無度臍腹疼痛腰膝無力

陳氏

雞內金

卷之六

卷之四

遠志

肉苁蓉

五味子

新書

附子

桑葉葉各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒飲任下

當歸煎濟生方治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦

當歸去芦酒浸

赤芍藥

牡蠣火煨取粉

熟艾酒浸蒸焙

阿膠

白芍藥

續斷酒浸各二兩

地榆半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九丸空心米飲下

卷柏丸濟生方治婦人室女腹中冷熱相攻心腹疼痛赤白帶

下面色痿黃四肢羸乏

黃芪

兩半熟地黃

洗一兩半鹿茸

卷柏醋炙

白石脂

赤石脂

醋淬各七次

川芎

鹽中醋炙各藥

代赭石醋煨淬七次桑寄生

常歸去芦酒浸炒

地榆各一斤木香不見火龍骨各半斤

乾姜七斤半

一右為末醋煮糯米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下
成喜丸 和劑方治婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常濕小便如米泔或無子息

白茯苓去皮四兩

黃蠟四兩二斤

猪苓二斤半去皮

同茯苓於磁器內煮二十餘沸出上乾不用猪苓

右取茯苓為末容蠟丸彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服忌米醋及使性氣

白芷散 大全良方治婦人赤白帶下

白芷一兩 海螵蛸二斤燒胎髮二斤燒

右為末空心酒調服二錢

麝香丸 御藥院方治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久无子息

零陵香

藿香各二錢蛇床子五分吳茱萸

枯礬

木香各三錢射香二分半丁香

龍腦一錢半不灰木

白芷二錢半龍骨五錢

右為末煉蜜為丸每兩作四十九丸每用一九綿裹納陰中

大効拱辰丸 秘方治婦人血海虛冷白帶時下脐腹刺痛久服

令人延年精神充實多子嗣

琥珀二錢當歸酒浸沉香

木香

官桂各不見火

人參

黃芪

鹿茸酥炙乳香

沒藥各一兩

丹溪心法
卷四
酸枣仁

半兩

鹿角霜

乾姜

延胡索

栝子仁各半兩

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一九溫酒化下空心

暖宮妙應丸秘方治婦人赤白帶下

艾葉

龍骨

當歸

川芎

牡蛎

白芍藥

牡丹皮

茯苓

赤石脂

熟地黃

右等分為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心艾醋湯

艾煎丸經驗方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子淨

艾葉各一兩蔓荊子

神麪

枳殼去穢

當歸各二兩吳茱萸

蓬莪朮各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附艾葉以醋盡為度揀去艾葉入糯

米糊捻作餅子日乾同前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服

服二十九食前來飲下醋湯亦可

○已上數方辛溫去濕寒之劑

戴人玉燭散

當歸

芍藥

川芎

熟艾

大黃

甘草

右咬咀生薑三片煎服

十束湯

見脇痛類

神佑丸

見中濕類

○已上三方苦寒除濕熱之劑

○廣按婦人赤白帶下之症多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝和乘脾木氣尅土則脾受傷而有濕而生熱也則

流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出也古人作濕寒而用辛溫之藥治之者非而丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾用辛溫之藥治之而愈者殊不知用苦寒之藥是正治之法也用辛溫之藥是從治之法也蓋濕熱怫鬱於內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥從治而能開散之乎然濕熱未嘗怫鬱但止赤白帶下而肚腹痛之症不若用苦寒之藥並治之為當也

丹溪心法附錄卷二十終

丹溪心法附餘卷之二十一

革集

壬集

婦人問 下

產前 九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血 產婦因火動胎逆上作喘急者急用條

芩香附之類爲末調下條芩水中取沉者爲佳 墮胎丹氣虛

血虛血熱 黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行 益母草

即芩蔚子治產前胎後諸病能行血氣血難產可煎作膏地黃

膏牛膝骨皆可用 懷妊愛物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝

氣止能生胎無餘用也又云不能用其肝肝虛故愛酸物 產

前安胎白朮黃芩爲妙藥也條芩安胎聖藥也俗人不知以爲

丹溪心法卷之二十一 婦人胎前

害而不敗用反為溫熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱令血
循經而不妄行故能養胎 胎熱將臨月以三補丸加炒香附
炒白芍藥蒸餅丸服 抑熱以三補丸用地黃膏丸 有孕八
九月必用順氣須用枳殼紫蘇梗 凡妊婦脉細勻芴產大
浮緩火氣散難產 生產如抱船過堤一般
入方 固胎

地黃半錢 歸身 人參 白芍各二錢 白朮一錢半

川芎五分 陳皮一錢 黃芩半錢 甘草二分 黃連少許

黃柏少許 桑上牛兒藤七葉圓者 一本無芩

右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用阿膠
痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩 夏一兩 春秋七錢半 冬五錢 白水 二兩 不見火

茯苓 七錢半 不見火 陳皮 三兩

右爲末 粥丸服

達生散 又名東胎散

大腹皮 三錢 人參 陳皮 各半錢 白朮

芍藥 各一錢 紫蘇 各半錢 甘草 炙二錢 歸身尾 一錢

右作一服入青葱五葉黃楊腦七箇此卽黃楊樹葉稍兒也
或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十數貼甚得
力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有別証以意消息
于後

○氣虛加參朮 氣實倍香附陳皮 血虛倍當歸加地黃

形實倍紫蘇 性急加黃連 有熱加黃芩 濕痰加滑

石半夏 食積加山楂 食後易饑倍黃楊腦 有痰加半

夏 腹痛加木香桂

又方 第九箇月服

黃芩 一兩酒炒不宜涼 白朮 一兩 枳殼 錢七

滑石 七錢半臨月十日煎

右為末粥丸梧子大每服五十丸空心熱湯下多則恐損元

氣氣實人宜服

又方 安胎

白朮 黃芩 炒麴

右為末粥丸服 一本云用條茶一二兩為末每一錢或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食若是也肥者有痰瘦者有熱須用二陳湯

入方

白朮不以多少

右為末水丸隨所好或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子必用一合

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩 茯苓四兩 當歸

芍藥各二兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去滓空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲 治妊娠轉胞

白朮

半夏製

陳皮 甘草

右咬咀入生姜煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉

阿膠

當歸

川芎各三兩

甘草一斤

右每服五錢水煎次下膠令泮溫服

○產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有
氣血疑滯而不能轉運者臨月時服野天麻熬膏白湯調下油
蜜小便和極勻治難產。○入方

砂仁

香附醋煮

枳殼

甘草

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末

催主

丹溪心法附余

卷之八

一

甘

三

五

七

白土灰

百草霜

滑石

右為末用弓婦煎湯調下或姜汁服

天麻丸 易產

天麻即益母草六月間連根採陰乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在三个月五個及七个月除跌撲損傷不拘外若前次三个月而墮則下次必如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應棄其虛也遇有半產者產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛

後即服固胎藥十數服以防三月之墮至四個半月後再服
八九服防過五月又至六個半月後再服五七服以防七月
及至九個月內服丹溪連生散十數服可保無虞其有連墮
數次胎元損甚者服藥須多又則可以番方用四物湯加入
參白朮陳皮茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有
痰加姜製半夏調理妊娠在於清熱養血條實黃芩為安胎
聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬猶鍾懸於
梁上軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因
氣腦致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂少佐
木香以行氣

附脈理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實在左浮大在右君女左男可以預剖離經六至沉細而滑墜痛連腰胎即時脫血瘕弦急而大者生虛弱者即是死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危

附諸方

驗胎方 經脈不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微動則有胎也否則是經滯

○胎動不安

安胎散濟生方治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血縮砂不拘多少於熨斗內炒令熱却去皮研為細末

每服二錢熱酒調服艾鹽湯亦可

川芎散簡易方治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹脘疼痛
南川芎為末每服二錢溫酒調下

佛手散大全良方治妊娘胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸去芦酒浸

芎藭各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉

阿膠

右二味水煎服

膠艾湯濟生方治妊娠或因損仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃洗

艾葉炒

白芍藥

川芎

黃芪去芦

阿膠蛤粉炒成末

當歸去芦酒浸

甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片枣一枚同煎去滓空心服
杜仲九濟生方治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮須宜服之
杜仲去皮剉姜汁炒去絲川續斷酒浸各二兩

右為末末肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服三十九丸米飲
安胎當歸湯大全良方療妊娠五月舉動驚愕胎動不安下墜
小腹引腰脇小便疼痛下血

當歸

阿膠

川芎

人參各一兩

枣子二枚

艾一虎口

右細切酒水各二升合煮至三升內膠令烊分二服復中當

安小便當煖也 一方有甘草無參朮

旋覆花湯大全良方療姙娠六七月間治不安常處亦名阻病

旋覆花二兩厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各三兩半夏炒一方無

芍藥

生姜各二兩

右咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去滓溫服食前忌羊肉

錫醋桃李雀肉

芍藥湯大全良方治姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡疼乍

寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米

泔或青黃寒慄腰背苦冷痛面目視茫茫

芍藥二兩人參

當歸

甘草各二兩白朮一兩

厚朴二兩廼白切二升生姜切四兩

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等物

三 香散聖惠方療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重宜服

香附子一兩藿香葉

甘草各二錢

右爲細末每服二錢鹽沸湯調下

當歸湯大全良方治妊娠胎動澁心煩躁悶絕口乾橫生倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷 科名保安飲

當歸

人參各一兩半阿膠一兩炒甘草二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一握煎至八分去滓溫服 一方無甘草有川芎厚朴產保方有川芎

阿膠散大全良方治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎各七錢

阿膠炒七錢半

當歸炒

陳皮各一兩甘草二錢

生姜三片

棗二枚

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分食前溫服

龍骨散大全良方因藥損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃各八分艾葉炒四分

地榆

阿膠

芍藥

乾姜各六分

蒲黃五分

牛角鰓炙焦三分

右爲末食前未飲調二錢服

當歸散大全良方療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

丹溪心法附錄 卷一

當歸

川芎各八分 阿膠炒

人參各六分

艾葉四分

大棗二枚

茯苓十分

右咬咀每服八錢 生姜三片 水一鍾半 煎至八分 去滓 食前溫服

一方 治胎動出血 產門痛

用黃連為末 酒調一錢 日三服

立聖散 胎動不安 下血不止

用雞肝二具 好酒一斤 煮熟 其酒食之 大効

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩各二兩 白朮半兩

右五味為末 酒飲調服 方寸七日二次 或用酒糊為丸

梧相子大每服五十九茶湯任下空心食前服日三次
此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產
者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有姙娠則碍脾運化遲而生濕濕而生熱古人
用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱
故也况姙娠賴血以養此方又加當歸川芎白芍以補血
尤為備也服此劑之後允為易產所生男女兼無胎毒則
痘疹稀少無病易育而聰明智慧不假言矣此端本澄源
之事也累試累驗

安胎飲水類方治懷胎三四月至九月惡阻病者心中潰悶
頭重目昏眩四肢沉重憊墮不欲動作惡聞食氣欲吃鹹酸

睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腹腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之

甘草炙

茯苓去芦

當歸去芦

川芎

熟羊酒蒸焙白朮

黃芪去苗

白芍藥

半夏湯泡七次阿膠蛤粉炒地榆等分

右咬咀每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分去滓溫服不

拘時候一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白朮

黃芪半夏地榆有艾是膠艾湯加白茯苓

安胎和氣飲諸生方治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛

滑者

訶子去核麩裹煨

白朮各二兩

陳皮去白

高良姜炒

木香不見火陳米炒 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散濟生方治妊娠忪悸腰裏多驚腹脇膨脹坐卧不寧

白茯苓去皮川芎

麥門冬去心當歸去芦酒浸各一兩

黃芪去芦蜜炙木香不見火人參

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去滓溫服

芎藭補中湯濟生方治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮

乾姜炮五錢阿膠蛤粉炒芎藭

五味子各一兩

黃芪去芦蜜炙當歸去芦酒浸白朮

赤芍藥各一兩半

木香不見火人參

杜仲去皮炒甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

益母丸 醫方大全專治產難橫逆併安胎順氣

用益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其葉莖陰乾不見日忌鉄器以石磨為末煉蜜丸如彈子大每服一丸臨產時以童子小便溫酒送下 若氣不順木香人參湯或艾醋湯下

枳實換柳丸 宣明方安養胎氣和調經候破癥瘕癖塊有似姙孕可以久服血氣通和兼寬膈養食

枳實生 換柳 黃連 黃蘗 黃芩

當歸 阿膠灰炒研 木香各半兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十九日進三服

黃芩湯 宣明方治婦人孕胎不安

白朮

黃芩 各等分

右為末水和二三錢水二鍾入當歸一根同煎至一鍾溫服

黃芪散

人全良方

療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢

川芎

甘草

各五錢

黃芪

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參

各二錢

右咬咀每服八錢生姜三片棗二枚水一鍾半煎至八分食

前服

知母丸

聖惠方

治月日未足而似欲產腹痛者

用知母為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸溫酒嚼下日一服

一方如梧桐子大每服二十丸粥飲送下

槐子丸

大全良方

治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃等分

右為末煉蜜丸如梧子大溫酒下三十丸以痛止為度

胎漏

如聖湯

濟生方

治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸

去芦酒浸

熟地黃

酒蒸

白芍藥

川芎

阿膠

蛤粉炒成珠

川續斷

酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一鍾亭根少許姜五片同煎溫下

桑寄生散

濟生方

治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸

去芦酒浸

桑寄生

川續斷

酒浸

川芎

白朮

香附子

炒去毛

阿膠

蛤粉炒成珠

人參

茯神

去木各一兩

甘草

炙五錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去渣不拘時溫服

二黃散

拔萃方

治婦人胎漏下血

生地黄

熟地黄

各等分

右爲細末煎白朮枳殼湯調下二錢食前服

枳殼湯

拔萃方

治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼

去穰麩炒

黃芩

各半兩

白朮

一兩

右爲末水煎食前溫服

秘傳當歸寄生湯

治妊娠胎漏非時下血

當歸

川芎

艾葉

白朮

各一錢

人參

桑寄生

續斷

熟地黄

各二錢

用水二鍾煎至一鍾去滓空心溫服

厚朴散 無故卒下血

阿膠

二兩蛤粉炒成珠爲末

生地黄

半斤搗取汁

右以清酒三升將二味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨

一兩

蒲黃

半兩

右爲末酒調每服二錢日三服

一方 胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石菖蒲根搗汁三升飲之

一方

用楨榔一兩爲末葱白湯調下一錢

榆白皮散

簡易方

治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

大麻仁

土一殼

瞿麥

各一兩

木通

半兩

牛膝

七錢半去苗酒浸八炷

右咬咀每服四錢水一鍾煎八分溫服

地黃當歸湯 治胎痛

當歸

一兩

熟地黃

二兩

右爲末每半兩水煎良方等分爲末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人妊娠惟在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若不服爲愈

胎前心海附錄

醫經綱目卷之七

十三

○惡阻

半夏茯苓湯

和肺方

治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

旋覆花

陳皮

去白麩炒

桔梗

白芍藥

人參

去芦

甘草

炙

川芎

各半兩

半夏

炮二兩二錢半

赤茯苓

熟芩

各七錢半

石咬咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熟服

茯苓

和劑方

治妊娠惡阻停飲憂聞食氣當與茯苓湯俱送

赤茯苓

去皮

人參

上片

肉桂

去皮

乾姜

炮

半夏

洗七次焙

陳皮

各一兩

白朮

葛根

甘草

炙

枳實

去白麩炒黃各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

竹茹湯

和劑方

治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅

去白一兩

人參

一兩

甘草

二錢半

麥門冬

去心二兩

白朮

一兩

厚朴

姜製各半兩

白茯苓

半兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子大同

煎至八分溫服不拘時

小地黃丸

和劑方

治妊娠惡心嘔吐清水腰痛不食

人參

去芦

乾姜

炮各等分

右爲末用生地黃汁丸如梧桐子每服五十丸白朮湯下食

前服

參橘散

和劑方

治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓

橘皮

去白各二兩

麥門冬

去心

順溪心法附錄

卷之五

白朮

厚朴

姜製

甘草

炙冬五錢

右收咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許麝至七分去滓

溫服

白朮散

簡易方

治妊娠胎氣不和不進飲食

白朮

炒

紫蘇

各一兩

白芷

炒

人參

各一兩

訶子

青皮

去白

川芎

各七錢半

甘草

二錢半

右收咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分不拘時服

旋覆半夏湯

濟生方

治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧步

起者

旋覆花

川芎

細辛

洗去土

甘草

炙各半兩

半夏

湯洗七次

赤茯苓

去皮

當歸

土去戶酒浸

人參

半兩

乾生薑

陳皮各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去滓溫服

人參半夏丸濟生方治妊娠惡阻醋心胸腹冷痛吐逆不食

半夏湯泡七次

人參

乾生薑各半兩

右為末以生地黄汁浸蒸餅丸如梧桐子大每服四十九米

飲送下

白朮散大全良方治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮一兩

人參五兩

丁香二兩半甘草一錢

右咬咀每服一兩生薑五片水二鍾煎至一鍾去滓溫服

人參橘皮湯聖惠方治阻病嘔吐痰水

人參去芦

橘皮

白朮

麥門冬

甘草三升

厚朴製

白茯苓各半升

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片竹茹一彈煎至一鍾去滓

食前溫服 集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散 大經方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參五升

丁香

藿香各二升半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯 大經方治婦人經候不調或不行身無病似病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如竟惡心嘔吐加丁香生薑煎

人參

甘草各二兩白朮

香附子

烏藥

橘紅各五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半生姜三片煎七分去滓溫服不拘時服或為末調服亦可子然令母虛

○子煩

竹葉湯簡易方治妊娘心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩防風

麥門冬去心黃芩各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

知母飲簡易方治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓

黃芩

黃芪各三兩知母

麥門冬

甘草各二兩

右咬咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹瀝同服
竹茹湯大全良方療妊娘煩躁或胎不動

淡青竹茹一兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散濟生方治妊娘心驚膽怯名曰子煩

麥門冬去心防風

白茯苓各一兩人參半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分溫服

歸涼接命散濟生方治妊娘面赤口苦心煩腹脹

川芎

苧麻

白芍藥

麥門冬去心

當歸去芦酒浸白朮各一兩糯米半合甘草炙五分

右咀咬每服四錢水一鍾半煎至一鍾去渣溫服

麥門冬散

聖惠方

療妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣頭眩

四肢沉重百節疼痛多臥少起

麥門冬 子芩

赤茯苓 柴胡

赤芍藥

陳皮 人參

桑寄生 桔梗

甘草

旋覆花

各半兩

生地黄

二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓食前

溫服

柴胡散

聖惠方

治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡 一兩半

赤茯苓

麥門冬

各一兩

枇杷葉

去毛

人參

橘皮

甘草

各三錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓溫服

無時

人參散

聖惠方

治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅乾口

古乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角屑

各七錢

甘草

五錢

右收咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服

○子癇

羚羊角散

水銀鈴方

治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇

澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角

銹

川獨活

酸棗仁

炒

五加皮

各半錢

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

各四分

木香

甘草

各二分半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服

防風湯

大全良方

治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能言四

肢強急

防風

寄生

葛根

各一兩

菊花

防已

細辛

秦艽

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角

各半兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓加竹

瀝半合溫服不拘時候

葛根湯

聖惠方

療妊娠臨月因發風瘕忽悶憤不識人吐逆眩

倒少醒復發名曰子癇

升陽八法附錄
卷一
百病新書
卷一

葛根 貝母 牡丹皮去心 防風 防已

當歸 川芎 白茯苓 官桂 澤瀉

石膏 獨活 人參各二兩

右咬咀每服八錢水二鍾煎至八分去滓溫服無時

防風葛根湯 姪娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生地黄各二兩

杏仁製 麻黃去節各一兩半 桂心少許

獨活 甘草 防已各一兩

右每服八錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

一方 姪娠中風角弓反張口噤語澁調之風瘧亦名子癇

麻黃去節 防風 獨活各一兩 桂心少許

羚羊角

升麻

甘草

酸棗仁

秦艽各半兩川芎

當歸

杏仁製各七錢

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分加竹瀝一合溫服

○子腫

全生白朮散

簡易方治姙娠面目虛浮肢躰腫如水氣名子腫

白朮

一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

白茯苓皮

各半兩

右爲末每服二錢米飲調下不拘時

五皮散大全良方治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

陳皮

生姜皮

等分

右咬咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八分去

滓溫服不拘時

方空心服

丹清心法附錄 卷上

防已湯 脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已 七錢半 木香 二錢 赤茯苓 桑白皮

紫蘇莖葉 各一兩

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服 如大

便不通加枳殼枳實

○子氣

李氏天仙藤散 治妊娠自三月成胎之後兩足自脚而漸腫

腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣至於脚

指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤 洗畧炒 香附子 炒 陳皮 甘草

烏藥 等分

右爲末每服三錢水煎入姜三片紫蘇三葉木瓜三片同煎
空心食前服日三次腫消止藥

腎著湯大全良方治姙娠腰脚腫

茯苓

白朮

各四錢

杏仁

甘草

各三錢

右咬咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前服

○子淋

安榮散

濟生方

治姙娠小便澁少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬

去心

通草

滑石

各三錢

當歸

去芦酒浸

灯心

甘草

各半兩

人參

細辛

各一兩

右爲細末煎麥門冬湯調下不拘時

大腹皮散

濟生方

治姙娠大小便赤澁

枳殼 去白

大腹皮

甘草 炙各一錢

赤茯苓 去皮三錢

石礬末每服一錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散濟生方治姙娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲倒

冬葵子 三錢 赤茯苓 去皮二錢

右爲末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞

加髮灰少許極妙

○轉胞

八味丸 治姙娠小便不通名曰轉胞亦治子淋

方見補損

全生茯苓散簡易方治姙娠小便不通

赤茯苓

葵子 各等分

右呖咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方加
灰少許同服極効

○子懸

紫蘇飲濟生方治胎氣不和湊湊心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎

白芍藥

陳皮去白紫蘇葉

當歸

去芦酒浸各一兩人參

甘草各半兩

右呖咀每服四錢水一鍾生姜五片葱白七寸煎至七分空
心溫服

香木散

大全良方治妊娠五箇月已後常常胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒愛思過度飲食失節所致

蔡元慶龍人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王師復

此方三服而愈

我木煨一兩丁香五錢

甘草一錢半

右為細末每服一錢空心鹽湯調服胸如物推下之狀

○黃按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胸腹之間氣刺
滿痛此言良是蓋婦人上有男姑丈夫事觸物忤不能自
決而憂思忿怒沉鬱于中升溪云氣鬱便成火火載胎上榮
衛不通則心腹之間脹滿痛俱作也宜矣

○兒在腹中哭經驗方

用多年空釜下鼠穴中土一塊令孕婦嚼之即止

又方經驗方

用川黃連濃煎令母啗之

○鬼胎

斬鬼丹 鬼胎如抱一瓮

吳茱萸

川烏

秦艽

柴胡

白殭蚕

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出惡物愈

○風寒熱病

表虛六合湯聖惠方若姪娘傷寒中風表虛自汗頭痛項強身

熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯四兩桂枝

地骨皮各七錢

表實六合湯聖惠方治姪娘傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊惡寒

太陽經病宜合

四物湯四兩麻黃

細辛各半兩

風濕六合湯聖惠方若妊娘傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而瀉頭痛太陽標病也宜服

四物湯四兩防風

蒼朮製各七錢

升麻六合湯聖惠方治妊娘傷寒下後過經不愈濕毒發斑如錦文宜服

四物湯四兩升麻

連翹各七錢

柴胡六合湯聖惠方若妊娘傷寒胸膈滿痛而脈弦少陽頭昏項強宜服

四物湯四兩柴胡

黃芩各七錢

大黃六合湯聖惠方若妊娘傷寒大便秘小便赤氣滿而脉沉

數陽明太陽本病也急下之宜服

四物湯四兩大黃五錢 桃仁十箇去皮尖熬炒

人參六合湯聖惠方治妊娘傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯四兩人參 五味子各五錢

厚朴六合湯聖惠方若妊娘傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本

虛宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯四兩厚朴 枳實姜炒各五錢

枳子六合湯聖惠方若妊娘傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯四兩枳子 黃芩各五錢

石膏六合湯聖惠方治妊娘傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉長而

大者宜服

四物湯四兩 知母各五錢

茯苓六合湯聖惠方若妊娘傷寒小便不利太陽本病也宜服

四物湯四兩 茯苓 澤瀉各五錢

琥珀六合湯聖惠方若妊娘傷寒太陽本病小便赤如血狀者

宜服

四物湯四兩 琥珀 茯苓各五錢

膠艾六合湯聖惠方治妊娘傷寒汗下後血漏不止胎氣損者

宜服

四物湯四兩 阿膠 艾葉各半兩

一方加甘草同上 一方加乾姜并草黃者

手六合湯聖惠方若妊娘傷寒四肢拘急身微汗腹中痛

脈沉而遲少陰病也宜

四物湯四兩附子炮去皮臍桂各十兩

四物大黃湯聖惠方若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下宜服

四物湯四兩生地黃

大黃酒浸各五錢

蘇散方治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心胸煩

悶者

紫蘇葉川芎

白芍藥白朮

麥門冬去心

陳皮去白乾荷各兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白三寸煎服

白朮散後萃方治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不

下食

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

赤茯苓各二兩廿草

半夏湯泡七次姜汁炒各半兩

右吹咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎去滓溫服無時
升麻散按方治如娘傷寒頭痛身熱

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃去節各二兩

黃芩

石膏各半兩石高日二兩

右為粗末每服四錢生薑四片竹葉二七片水同煎

芍藥湯按方治婦人如娘傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉
者太陰也宜服此藥

芍藥

白朮二兩廿草

茯苓各五錢黃芩二兩

右細劉每服一兩水煎服

麻黃散聖惠方治姪娘五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥各一兩

甘草半兩

右咬咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓通服
前胡湯大全良方治姪娘傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏十二分前胡六分

甜竹葉三分黃芩

大青各五分知母

梔子各四分

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓溫服
不拘時 外莖無甜竹葉

黃龍湯聖惠方治婦人姪娘寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛嘔

逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷
病後勞復餘熱不鮮宜服

柴胡去芦二兩黃芩

人參

甘草各三錢七分半

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服無時
枳實散聖惠方治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣
渴不止飲食不多腰疼身重

枳實炒一兩陳皮七分半麥門冬去心半兩

右咬咀每服一兩水一盞半生薑半錢葱白七寸煎至八分
溫服

麥門冬湯聖惠方治妊娘傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎動
不安

人參

石膏各二兩 前胡

黃芩各七錢半

家葛根

麥門冬各五錢

石吹咀每服一兩水二盞生薑三片棗二枚竹茹一錢半煎

至一盞去滓溫服不拘時

秦光散

傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語嘔逆

秦光

柴胡

石膏

前胡

赤茯苓

甘草節

葛根

犀角屑

升麻各等分

右每服八錢水二盞薑三片竹茹三錢煎至八分溫服

○廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語吐逆

此即濕熱病之證候也古方濕熱病皆謂之傷寒多不分

也用者審之

黃芪解肌湯聖惠方治妊娠傷風自汗

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草各半兩

芍藥六錢

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時加
蒼朮生地黄亦可

柴胡散聖惠方治妊娠熱病骨節煩痛頭痛壯熱若熱不治則
損胎

柴胡

葛根

知母

梔子

甘草各五錢

石膏三兩大青

茯苓

升麻各七錢半

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓通口
服不拘時候 一方有黃芩無茯苓

梔子仁飲子大全良方治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急
絕胎歌落

梔子仁

升麻

石膏

地黃各二兩

大青各一兩豆豉四十九粒

救急方有杏仁無地黃石膏

右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去滓溫服無
時一方加青黛無大青又方以陳艾如雞子大酒煮服

救妊婦危困

大黃飲子聖惠方治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘澀
煩熱

大黃微炒

石膏各一兩知母

前胡

赤茯苓各三錢 梔子仁

甘草

黃芩各五錢

右咬咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去滓溫服食前

柴胡石膏湯 聖惠方治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶亂四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服

柴胡四兩

甘草二兩

石膏八兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服無時若氣虛身冷加人參四兩

○傷寒熱病護胎法

一方 用白藥子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上如碗大貼臍下胎存處乾以濕水潤之

一方 以灶心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢

一方 壯熱甚并底泥敷心下令胎不傷

○雜病

消風散 濟生方治姙娠肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩目暈腮項

腫核胸膈涎壅

石膏煨 甘菊花 去枝梗 防風 去芦 荆芥穗

川羌活 去芦 川芎 羚羊角 鎊 大豆黃卷 炒

當歸 去芦 浸白芷 各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去滓食後

溫服

天門冬飲子 濟生方治姙娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬去心知母

羌蔚子各二兩防風去芦半兩

五味子

茯苓去皮

川羌活去芦人參各七兩半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去滓食後溫服

百合散濟生方治妊娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合蒸

紫苑茸洗

貝母去心

白芍藥

前胡去芦

赤茯苓

去皮桔梗去芦炒各一兩

甘草炙五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分去渣溫服不拘

時候

百合散聖惠方治妊娠咳嗽心胸不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮各一兩

甘草半兩竹茹一團

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸去滓食後溫服

紫苑湯永類鈴方治姙娠咳嗽不止胎動不安

甘草

杏仁

桑白皮各二錢半

紫苑

天門冬去心各一兩桔梗半兩

右咬咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散大金良方治姙娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母各五錢陳皮

大腹皮

紫蘇

桑白皮各二兩五味子七錢

右吹咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去滓食後
溫服

平安散濟生方治妊娘上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴

生薑各二錢乾姜炮陳皮去白各一錢

川芎半錢木香二錢半乾地黃洗一錢半甘草炙四錢

右吹咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

驅邪散齊生方治妊娘停食感冷發為瘧疾

高良姜炒白朮

草果仁橘紅

藿香葉

縮砂仁白茯苓去皮各一兩甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

小胡散治妊娘瘧疾

黃芩一錢半 甘草一錢

柴胡

生大黃各二錢

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度如胎上通心可服枳殼散忌油麵辛酸之物

一方

治瘧疾發熱口乾渴飲無度

生地黄一兩半 黃芩

麥門冬去心人參

知母

乾薑各一兩 石膏二兩 甘草半兩

右每服一兩水一鍾半烏梅半个煎至一鍾溫服

一方

治瘧疾

常山

石黃各一兩 甘草炙

黃芩各半兩

烏梅七个炒

右作二服每服酒水各一碗浸一宿平旦煎服

參姜黃連丸 濟生方 治妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆可服

乾姜炮

黃連去蘖縮砂仁炒川芎

阿膠蛤粉炒

白朮各二兩乳香二兩別研

枳殼去白麩炒半兩

右為末用鹽梅三個取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子大每服四十九丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯下 赤白痢乾姜甘草湯下

當歸芍藥湯 濟生方 治妊娠腹中疼痛下痢

白芍藥

白茯苓去皮當歸去蘖酒浸澤瀉

川芎各一兩白朮一兩半

右為末每服三錢空心溫酒米飲下

白朮湯 治孕婦下痢膿血

白朮

黃芩

當歸已上各四錢

右用水二盞煎至一盞去滓溫服食前

大龍散按率方治姙娠氣痛

艾葉末鹽炒一兩半

茴香

川練子各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服

白朮湯千金方治姙娠卒心痛欲死不可忍者

白朮三兩去黑心

赤芍藥二兩黃芩一兩去黑心

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時忌

桃李崔肉

喜神散大全良方治姙娠中惡心腹疼痛

當歸

丁香

川芎各三兩青皮二兩

吳茱萸半兩去梗湯泡三次

右為末無時溫酒調一錢服

芎歸湯按率方治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸

當歸各三兩厚朴製

白芍藥各二兩

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

一方有桔梗無官桂

○廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈甚則

此方與前白朮湯中皆犯藥禁未知果否否乎

倉公下氣湯大全良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食

四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

官桂

各五錢紫蘇

二兩

右咬咀每服八錢生姜五片枣一枚水一盞半煎至八分去

滓溫服食前

勝金散清生方治姙娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸酒浸炒

陳皮去白生薑

乾姜炮

川芎

厚朴去皮縮砂仁炒甘草各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

通氣散大全良方治姙娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不拘多少瓦上炒香熟

右為末嚼胡桃肉半個空心溫酒調下二錢

消熱飲子聖惠方治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利最宜

服之

川芒硝一兩細研 葵子三兩搗

右為末每服五錢溫水調下無時 一方水二大盞煎至一

盞三分去滓不計時溫服

一方 治孕婦大便秘澁大全良方

枳殼麤炒三兩 防風去芦三兩 甘草炙一兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散濟生方治妊娘小便不禁

桑螵蛸二十个炙為細末每服二錢空心米飲調下

白薇子濟生方治妊娠遺尿不禁

白薇

白芍藥各等分

右為末每服三錢食前溫酒調服

○瘦胎

瘦胎枳殼散簡易方治妊孕七八月常宜服滑胎易產

粉甘草

一兩半炙

商州枳殼五兩去白麩炒赤

右為末每服一錢空心白湯點服 一方加香附子尤佳

○廣按前人云枳殼散性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸湯蜜丸佐之可也說見前

地黃當歸湯 補血養胎與枳殼散間服蓋枳殼散破氣有餘

而地黃當歸湯補血不足也方見前

救生散濟生方治胎氣本法不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產

人參

訶子煨去核白朮

神麴

陳皮各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

○催生

催生如聖散

黃葵花不以多少焙乾

右為末熱湯調下二錢神効

或有漏血胎臟乾澀難產痛

劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下

如無花即

以蜀葵子研爛小半合以酒調尤妙亦治打撲傷損

如

胎死不下煎紅花溫酒調下

經驗方用子四十九粒或三

十粒散曰黃金內子三十粒細研酒調能備急命若懸絲在

須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神妙佛手散大全良方治婦人妊娠五七月因事築壅着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸六錢 川芎四錢

用水一盞半煎令泣欲乾投酒一大盞止煎一沸去滓溫服

口噤灌之如人行五里再服不過二三服便生

催生如意散聖惠方臨產腰疼方可服

人參為末一匙

乳香一錢辰砂五分

右將一處研臨產之時急用雞子清一个調藥末再用姜汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安

催生神效七寶散 大全良方臨產腰痛方可服

玄胡索

沒藥

白礬

香白芷焙

姜黃焙

當歸

桂心等分

右為細末每服三錢燒犂頭令紅淬酒調下臨陣疼時服一二服立差

催生如神散 聖惠方治逆產橫生瘦胎兼產前產後虛損月脈不調崩漏等証 一名催生黑散子 一名烏金散 一名

二神散

百草霜

白芷

不見火為末

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方童子便酒各半盞煎沸即調停熱服甚者不過再服

催生丹簡易方治產婦生理不順臨蓐艱難

十二月兔腦髓

去皮膜研

乳香研如粉一分

母丁香末一錢

射香細研一字

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾油紙各封貼每一丸破水後溫水下即時產下隨男左女右手握藥出是驗

催生鉛丹濟生方治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔投水銀一錢急攪結成砂子傾出以熟絹衣角紐作丸子如菜豆大臨產時射香水吞下

二九立下

催生散 懷孕不曾行動舒伸忍痛曲身仄卧故子在腹中不能轉動致有橫逆難產甚則子死腹中。

蛇退一條 蟬退二七個人退 即男子頭髮一團如雞彈大
右俱燒為末酒調下分作三服

一方

用蛇退一條全者燒灰入射香一字酒調二錢面東服如積生遂產以餘渣塗兩手足即順也

一方

用草鞋鼻繩路上者洗淨燒灰末童便和酒調服 一名千里馬

滑胎散 聖惠方催生神効

益元散一兩方見暑門

蛇退一條燒灰存性 牆簷上者好

男子亂髮香油一兩熬化

蟬退全者五个燒灰

穿山甲一片燒灰存性

右為細末用薤水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷定服

之立下

○難產

無憂散 濟生方治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨蓐難產

當歸

川芎

白芍藥各一兩

枳殼炒半兩

乳香三錢木香

甘草各一錢半

血餘灰三錢

右為末每服二錢水一盞煎至八分溫服不拘時

金液丸清生方治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛火燒如腋下毛尤佳血餘灰無病女人髮

硃砂別研 公母羊糞燒灰各半錢 灶上土一錢

黑鉛二錢用銚子火上鎔投水銀半斤急攪結成砂子傾出研令極細

右為末用粽子角為丸如菜豆大遇難產以倒流水吞五丸
來甦散濟世方治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩目
暈口噤面青髮直不省人事

木香

神麴炒

陳皮

麥蘖

黃芪去芦

生姜切炒黑阿膠

白芍各一錢

苧根三錢

甘草三錢

糯米一合半

右用水三盞煎至一盞半幹開口灌之連進為妙

二退散 治產難

蛇退 一條全者

蚕退紙 方圓一尺

石各燒存性爲細末酒調服

雲母散 橫生逆產

用雲母石投成粉每服一錢酒調下

救生散 橫生逆產

用桂心爲末童便酒調一錢服之神効

一方 治產難

用臍月兔頭一枚燒灰爲末葱白湯調二錢立生 又或吞

雞子黃三箇并少苦酒服之立生 又或用赤小豆三升水

九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎少時一服五合

又用槐子十四枚即下 又方用當歸爲末酒調方寸七

服之下

一方 治難產三日不下

用伏龍肝細研每服一錢酒調服之

一方 治胞衣不下

取皂屋黑塵研爲細末酒調方寸七

黑龍丹

治生方

治姙娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不省

人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫血入心
經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或顛廔疾胎前
產後一切聲急狼狽垂死以此藥灌三四丸無不救活者

五靈脂

當歸

酒浸

生地黄

小茅

良姜

各二兩

右剉入砂鍋內紙筋鹽泥固濟炭火煨通紅候火減冷取出
研細入後藥

百草霜 乳香

生硫黃 琥珀

花藥石

右五味計一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麪糊爲丸如
彈子大每要服用炭火煨藥通紅投入生姜自然汁浸碎之
以無灰酒併合重便頓服神効不可盡述

內灸散

和濟方

治婦人產前產後一切血疾血崩虛憊腹痛疼

痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中
雷鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞
傷勞弱月經不調下血墮胎血迷血暈血瘀時發疼痛頭目
眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足逆冷並

宜服之

方見前經病類下

○死胎

香桂散

大全良方

下死胎

射香

半錢另研

官桂

三錢末

右共和勻用溫酒一盞調服酒更如手推下

一方 治胎死腹中或半產不下

產寶方

官桂

五錢去皮

牡丹皮

川芎

葵子

各二錢二分半

右爲細末每服三錢煎葱白湯下

一字神散

大全良方

治子死腹中胎不下胞破不生此方累有

効驗

鬼臼

不拘多少黃色者去毛

右研爲末以手指撚之如粉極細爲度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝爲末每服二錢順流水調下甚者溫童子小便調服胎下母活亦治胎衣不下

霹靂奪命丹

濟生方

治臨產鬱然氣痿目翻口噤面黑唇青沫

出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿令婦妄雞犬見之

蛇退

一條入瓦罐內煨

金銀箔

各七片

丁香

半錢另研下

髮灰

一錢

馬鳴

即蚕退燒一錢

黑鉛

二錢半

水銀 七分半

依前法作用

千金馬

依前法作用

依前法作用

右爲末以獾猪心血丸如梧桐子倒流水灌下二丸如灌不

下研開亦可

如聖膏

大全良方

治難產兼治胞衣不下煎治死胎

用草蘇子七粒去殼細研成膏塗臍心胞衣卽下下速洗去
不洗腸出却用此膏塗頂上腸出縮入如聖之妙 一方用
四十九粒

○廣按產前諸証皆因胎氣所致大胎動胎漏皆下血而胎
動有腹痛胎漏無腹痛爲異爾故胎動宜行氣胎漏宜清
熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者煩躁而悶亂心
神也子癰者痰涎潮搐目吊口噤也子腫者面目虛浮肢
體腫滿也子氣者兩足浮腫也子淋者小便澀少也轉胞

者小便不通也子懸者心胃脹痛也蓋脾至運化水穀婦
人有胎則脾運化水穀不利而生濕濕則生痰痰生熱熱
生風也子腫子氣者濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也
子癰者風也子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消
之熱則清之風則平之氣則散之虛則補之何爲而不愈
哉外有風寒熱病雜病之條者用藥要去邪保胎之並行
有催生難產死胎之目者治法有緩急輕重之少異業醫
者其可忽乎

產後

九十六

壬集

丹溪心法

○產後無得令虛當大補氣血爲先雖有雜証以末治之一切

多足血虛皆不可發表

產後不可用芍藥以其酸寒伐生

發之氣故也

產後血暈因店火戟血上行漸漸暈來方用鹿

角燒灰出火毒研極細末好酒同童便嚥下一啣即醒行血極

快又方以雀巢細切盛於有指瓶中以熟醋沃之急封其口

以指塞產婦鼻中可愈眩暈之產後中風切不可作風治必

大補氣血為主然後治痰當以左右手之脈分其血氣多少而

治產後中風口眼喎斜切不可服小續命湯產後水腫必

用大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利產後大發熱必

用乾姜輕者用茯苓淡滲其熱一應寒苦并發表之藥皆不可

用產後發熱惡寒皆屬血虛左手脈不足補血藥多於補

氣藥惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是產後發熱

乳汁不通及膨者無子當消用麥蘖二兩炒研細末清湯調下
作四服 有子者用木通通草猪蹄煎服 凡產後有病先固
血氣 前條云產後大熱必用乾姜或曰用姜者何也曰此熱
非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾姜
能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥
同用此造化自然之妙非天下之至神孰能與於此乎 產後
脈洪數產前脈細小澁弱多死懷孕者脈主洪數已產而洪數
不改者多主死之

入方 產後補虛

人參

白朮

一錢

茯苓

歸身尾

陳皮

川芎

各半錢

甘草

炙二分

有熱加黃芩一錢

生薑三片水煎服

產後消血塊方

滑石

三錢

沒藥

二錢

血竭

二錢

如無以牡丹皮代之

右爲末醋糊丸

如惡露不下以五靈脂爲末神麴丸白朮

陳皮湯下

瓦礫子能消血塊

又方

血竭

五靈脂

右爲末消產後血塊極好

又方

治產後泄瀉

黃芩

白朮

川芎

茯苓

乾姜

滑石

陳皮

妙芍藥

甘草

炙

右咬咀水煎服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂

香附

一方加蛤粉

右爲末醋糊丸甚者入桃仁不去尖用

獨行丸 治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛有孕

者忌服

五靈脂

去土半炒半生

右爲末水丸彈子大每服一丸或酒或姜化下

參朮膏

治產後胞損成淋瀝証

人參

二錢半

白朮

二錢

桃仁

陳皮

各一錢

黃芪

一錢半

茯苓

一錢

甘草

炙半錢

右吹咀水煎猪羊胞後入藥作一服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問服何飲食有無傷積胸膈飽悶噯氣惡食泄瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法

附諸方

花藥石散

治產後胎衣不下極有神効

方見前跌撲損傷類

奪命丹

濟生方

治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或去血

過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急取鞋底炙
熱小腹上下熨之次進此藥

附子炮去臍半兩 牡丹皮去心乾漆炒令煙盡各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如梧桐
子每服五十丸酒送下

一方 產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

用錦文大黃一兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐子大
以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方 治產後生腸不收

用枳殼二兩去穢煎湯浸良久即入

一方 治婦人子宮不收

荆芥穗

藿香葉

臭椿皮

右等分咬咀煎湯薰洗子宮即入

一方 治婦人子宮太痛不可忍

五倍子

白礬

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方 治下胎或產後血上心已死

用爵金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立活

芎藭湯和劑方治產後去血過多暈煩不省一切去血並宜服之

芎藭

當歸去芦酒洗焙各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘時一腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬 或發寒熱加

乾姜白芍藥 水停心下微有嘔逆加茯苓生姜 虛煩不

得眠加人參竹葉大便秘澀加生地黃 橘紅杏仁 小便

不利加車前子 腹脇膨脹加厚朴 血崩不止加香附子

咳嗽痰多加紫苑半夏生姜 腰疼膝痛加牛膝 心下

疼痛加玄胡索 惡血不下腰腹重痛加牡丹皮

返魂丹 治生產一十六症 一名益母丸

野天麻一名益母草方梗四五月節間開紫花時採花葉子陰乾半斤

木香五斤 赤芍藥六斤 當歸七斤

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青黑童便酒

和勻煎沸化下

○產後惡血不盡臍腹刺痛重便和酒化下

○產時面垢顏赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生不順心悶欲死重便酒薄荷自然汁和勻化下鹽酒亦可

○產後三四日起卧不得眠暗生花口乾煩躁心亂見鬼狂言不省人事重便酒薄荷汁下

○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼溫米飲下

○產後浮腫氣喘小便澁咳嗽惡心口吐酸水脇痛無酒下

○產後寒熱如瘧臍腸作痛米湯下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語重便和酒下

○產後大便秘心煩口渴重便酒化下薄荷自然汁亦可

○產後痢疾月未滿食冷物與血相擊或有積毒湯化下

○產後身軀百節疼痛溫米飲下

○產後崩中漏下蓋是傷酸物狀如雞肝脊背悶倦糯米秦
芫湯下桂枝湯亦可

○產後食熱麪壅結成塊四肢無力睡後汗出不止月水不
調久成骨蒸勞童便和酒下

○產後嘔逆虛脹酒下

○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下

○產後赤白帶下秦芫同糯米煎湯下

○廣按返魂丹功效不可具述其於產前清熱養血產後推
陳致新無不可也
有事之家理宜預備

黑神散和濟方治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心眩

暈等証

黑豆炒半升熟地黄

當歸去芦酒浸肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四刃

濟生方除蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳

○廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用已是熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世俗好溫惡寒之弊於此見之也

黑龍丹

治姙娠臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省人事

及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服之方見前產

四味湯聖惠方療產後一切諸疾總方分悅宜服

當歸

玄胡索

血竭

沒藥各五分

右共二錢為細末用童子小便一盞煎六分通口服

如心

膈寒加當歸五分

如氣悶喘急加玄胡索五分

如惡露

不快加血竭五分

如心腹撮痛加沒藥五分

神仙索金散醫方大成治婦人產後血暈血虛積血不散寒熱
往來胸膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風瘡此藥逐
惡血生新血止肚痛

當歸

川芎

赤芍藥

熟地黄

金藤

川牛膝

麻黃

玄胡索炒官桂

神麴

荊芥

粉甘草

雄黑豆各一兩

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下不拘時候

一方 治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作二服酒二盞煎取一盞併服如口噤幹開口灌之

血竭破棺散秘方治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血男子傷力勞嗽吐血

乳香

血竭

箭頭砂各一錢

右為末巴豆仁研泥為膏磁器盛之如用丸如雞頭子大婦人狗膽冷酒下男子冷酒下

清魂散濟生方治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或漆器

燒烟鼻中薰之類置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉

人參去芦二兩 荊芥穗四兩 甘草各八錢

川芎二兩

白為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

奪命散 大全良方治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產後百病

沒藥

血竭

右等分為末綿產下使用童便與紙酒各半盞煎一二沸調下二錢良又再服其惡血自此下行更不衝上免生百病事治婦人方只用白湯調下

七珍散

大全良方論曰產後不語者何荅曰人心有七孔三毛

產後虛弱多致傳積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣
通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服此藥

川芎

人參

石菖蒲

生乾地黃各二兩

細辛一錢

防風

辰砂另研各半兩

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散大全良方治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

○廣按產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心竅者
前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥人多是熱
痰瘦人多是執

卷荷散

按釋方

治產

後血上冲心
血刺無暈血氣
腹有惡露

快並皆治之

初出卷荷二兩
紅花一兩

當歸一兩

蒲黃紙炒

牡丹皮各二兩

右為細末每服三錢空
心鹽酒送下二臘內用
童子小便調下大嚴密
湯密生方治產後血氣
衝心時發疼痛甚者宜
進玄胡

索湯

方見經病類

熟地黃

酒蒸焙

當歸去芦酒浸

川獨活去芦

白芍藥

細辛洗

吳茱萸炒桂心不見火
小草

乾姜各兩甘草炙半兩

右次咀每服四錢水一鍾煎服不拘時

當歸血竭在聖惠方治婦人產後惡物不下結聚成塊心胃痞悶及臍下堅痛

當歸炒 血竭 蓬朮 芍藥各二兩 五靈脂四兩

右為末醋糊丸如梧子大每服五六十丸溫酒送下或飯前下空心食前

荷葉散聖惠方治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩 桃仁半兩去皮尖麤炒 劉寄奴 蒲黃各一兩

右吹咀每服四錢半童子小便一大盞生姜三片生地黄一分煎至六分去渣熱服不拘時

笑散 治產後心腹絞痛欲死者 方見經病類

紫金丸大全良方治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱
頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲食亦
療心氣與失笑散同

五靈脂水淘去石沙乾秤為末 真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和
丸如櫻桃大每服一丸水與童子小便各半盞煎七分令藥
化溫服少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者
並用酒磨下

一方 治產後血暈腹痛

荆芥炒 川當歸炒 乾地黄洗 芍藥各半兩

蒲黃二錢半銚內隔紙炒赤

方... 產後...

四九

右同為細末每服三錢空心溫酒調服

地黃散按方治產後惡物不盡腹中疴痛

生乾地黃 當歸並炒各二兩 生姜半兩細切如塊項大

新瓦上炒令焦黑

右為細末姜酒調下二錢服

四神散和劑方治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾薑炮 川芎 赤芍藥各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸養血丸和劑方治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並皆

治之

肉桂一兩 當歸去芦 牡丹皮 玄胡索各二兩

赤芍藥二兩

右為末煉蜜丸如梧子每服一丸空心用溫酒米飲下

天仙藤散聖惠方治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤炒焦五兩

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下常患氣血用溫酒調下

玉燭散治產後惡露不盡臍腹疼痛時發寒熱

當歸

川芎

赤芍藥

熟地黃

大黃

甘草

朴硝各一錢半

右作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○廣授諸方治收血作痛皆是溫劑熱則流通之理惟此一

方却

五

方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結者設也非大
便燥結者俱不可用

一方 治產後敗血不止

生乾地黄一兩

用石器內搗為末每服二錢食前熱酒調服連進三服

瑞蓮散聖惠方治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮一百枚燒灰存性棕櫚燒灰存性

當歸各一兩

官桂半兩後柳二枚鯉魚鱗炒川芎各七錢半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服或時血

崩此藥可治但進三服即止

紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮

當歸

花

蒲黃

各等分

石為細末每服一錢酒調溫服 若胞衣不下以榆白皮煎

湯調服半兩立効

琥珀散聖惠方治產後經脉不通四肢煩疼飲食減少日漸羸

瘦者

琥珀

牛膝

土硫黃

當歸各一兩

桃仁

赤芍藥各五兩

右咬咀每服八錢水二盞生薑三片煎至八分去滓無時溫

服一方加桂心半兩

調經散齊生方治產後敗血停滯五臟流入四肢令人浮腫不

可作水氣治之但調其經而血自消又有去血過多心虛易

養如生龍腦一握煎服

沒藥研 四桂 不是火各一錢

赤芍藥

細辛洗手錢琥珀別研二錢

射香半錢麝香

常歸去芦酒浸各一兩 同芍藥甘草炙二錢

右為末每服二錢生薑汁溫酒任意調下

起痛散治生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸去芦酒洗 官桂 是火白木 川牛膝去芦酒

浸各半兩并甘草炙黃芩一兩去芦獨活去芦生薑各半兩

雄白三錢

右咬咀每服四錢水一盞煎服加桑寄生半兩木佳

此散專治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼痛

角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或樂心眼倒吐瀉或

刺赤總零焙

當歸身尾各等分

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神

口禁者幹開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麪糊丸

如梧子大每服五十九空心水湯下

血風湯產後諸風卒急或氣弱無力

川芎

芍藥

當歸

熟地黃

秦艽

羌活

防風

白芷

白朮

茯苓

右為細末一半煉蜜為丸如梧子大一半末溫酒調下丸

子五七十九

交加散治產後中風脇不得轉動

生地黄五兩研取汁

生薑五兩研取汁

右交互以汁浸渣一夕次日取盡汁各分黃煨為末酒調服

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸和劑方治新產血氣損傷脾胃不調百日內宜常服之

甘草炙二兩人參去芦

乾姜炮

白朮各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸空心米飲下

千金散 治產後虛勞不能食

白朮

茯苓

黃芪各二兩人參

川芎

芍藥

熟地黄一兩當歸二兩肉桂二兩半甘草炒半兩

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片棗三枚同煎至一盞空

人參當歸散和劑方治產後去血過多血暈則陰虛陰虛生內熱其証心胸煩滿吸吸短氣頭痛悶亂時轉甚真大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參去芦當歸去芦肉桂去皮白芍藥二兩

麥門冬去心各一兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黃當歸黃耆湯和劑方治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸去芦三兩

黃芪

白芍藥各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

增損四物湯濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未

盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸去芦酒浸 曰芍藥 川芎 乾姜

人參各二兩甘草半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

當歸羊肉湯濟生方治產後發熱自汗肢軀疼痛名曰蓐勞

當歸去芦酒浸 人參各七錢 黃芪去芦二兩

生姜半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入煎藥煎四盞去

滓作六服早晚頻進

猪腰子粥濟生方治產後蓐勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熱粥蓋之如作盒生粥狀空心服之

熟地黃湯澹寮方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黃一兩淨洗酒浸蒸焙久參去芦 麥門冬去心各二兩

甘草炙半兩 栝樓根四兩

右咬咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗二枚煎入分不拘時服

人參湯永類鉉方治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身

人參 去芦

右等分為末猪腰子一隻去膜切作片子以水三升糯米半

合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘

時服

大調經散聖惠方治產後血虛惡露未消氣未敗濁疑滯寒熱
不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣未平之所為也
大豆一兩半入皮茯苓一兩去皮 琥珀一錢

右為末每服三錢濃煎為豆豉湯調下

白茯苓散聖惠方治產後勞傷因生產日淺久坐多語運動
用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀

白茯苓一兩當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黃各半兩

石炭咀先用水二盞

猪腎一雙去脂膜細切生薑三片棗

子二箇同煎至一盞去腎姜藥入末藥五錢煮取七分去滓
食前分二服溫服

佛手散大全良方治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸

川芎

黃耆各二兩柴胡

前胡各二錢半

右吹咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一
枚生姜一片煎至六分去滓溫服如有痰去烏梅

黃龍湯大全良方治婦人寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆
痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘧并經水適來適斷病
後勞復餘熱不解

柴胡口口口分

黃芩

人參

甘草各二錢八分

右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時服

增損柴胡湯聖惠方治產後經水適斷感于異證手足搐搦咬

牙腎胃係屬上焦

柴胡八錢 黃芩四錢半 人參三錢 甘草四錢

石膏四錢 知母二錢 黃芪五錢 半夏三錢

右咬咀每服八錢 生姜三片 棗一枚 水一盞半 煎至八分去

滓溫服無時

增損柴胡湯濟生方治產後血虛發熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏

陳皮 川芎 白芍藥

右等分咬咀每服八錢 水一盞半 生姜五片 棗二枚 煎至八

分去滓不拘時通口服

三之一湯濟生方治產後虛勞雖日久而脉浮盛疾

柴胡八錢黃芩

人參

半夏洗

甘草炙

川芎

芍藥

熟地黃

當歸各三錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分去滓溫服

三聖散濟生方治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

白朮

白茯苓

黃芪各二兩柴胡

人參各一兩六錢

黃芩

半夏

甘草各六錢

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分去

滓通口食前服

一方無姜棗

○原按已上五方小柴胡湯加減法也學者對證而用則中肯綮矣

○已上諸方補虛退熱之劑

宣定理中丸 產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治男子脾胃虛弱久泄不止

人參一兩

白朮二兩

乾姜

甘草炙各五錢

肉豆蔻

七錢麩裹煨

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九空心米湯下酒煮麩糊為丸亦可

調中湯濟生方治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞泄不止者

良薑

當歸

肉桂

白芍藥

附子

皮

川芎

各一兩

甘草

炙

人參

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

白朮散

聖惠方

治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘皮

麥門冬

人參

乾薑

炮

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服八錢水一盞

半生薑五片煎至八分去滓服無時

時

枳實芍藥湯

聖惠方

治產後腹痛煩滿不得卧

枳實

燒存性

芍藥

右咬咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時

一方 爲末服方寸七日三

抵聖湯 濟生方 治產後血氣傷于脾胃腹脇痛悶嘔逆心惡

赤芍藥 半夏 湯炮 澤蘭葉 陳皮 去白

人參 各二兩 甘草 炙一兩

右咬咀每服四錢生薑七片煎服不拘時

又睨睨丸 濟生方 治產後氣血虛弱飲食停積口乾煩悶心下

痞痛

高良姜 炮 姜黃 洗 華澄茄 陳皮 去白 蓬朮 炮

人參 京三稜 炮各一兩

右爲末用蘿蔔慢火煮令極熱研爛將餘汁煮麪糊丸如梧
桐子每服五十丸就用蘿蔔湯送下

○廣按上六方皆為產後脾胃虛弱飲食過傷遂成諸疾而作也

旋覆湯

和濟方

產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞聲重

麻黃

去節

柴胡

杏仁

去皮尖
麩炒

五味子

去梗

旋覆花

甘草

炙

茯苓

赤芍藥

荆芥

去梗

半夏

各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

芎烏散

治產後頭痛

天台烏藥

川芎窮

右為末等分每服三錢燒秤鍾淬酒服

二母散

聖惠方

治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風痰嗽

用尋常傷風藥不效宜服

知母 貝母

白茯苓

人參各五錢

桃仁

去皮尖

杏仁

去皮尖各二兩

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

參蘇飲

聖惠方

治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參

一兩爲末

蘇木

二兩槌碎

右用水二碗煮取一碗去滓調入參末隨時加減服

丁香散

聖惠方

治產後心煩咳噫不止脾胃虛寒衛氣厥逆

白豆蔻

丁香

各五錢

伏龍肝一兩

右爲末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散

聖惠方

治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮石

一兩半

白茯苓

丁香

半兩

右爲細末每服三錢米飲調下不拘時

漢防已散 治產後風虛氣壅上攻咽喉腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮各一兩

商陸

甘草各七錢半

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服
無時 一萬空心服

調導散 聖惠方治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼各四錢製

甘草炙二兩

右吹咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎去一盞去
滓溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 治生方治後去血過多津液枯竭不能轉送大便閉澀

麻子仁

另明

枳殼

去白燹炒

人參

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫酒米飲任下

橘杏丸

治產後躰弱大便虛閉

方見廉結類

一方產後小便數及遺尿

龍骨

一兩

桑螵蛸

半兩炙

右為細末米飲調下二錢空心服

漏蘆散濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏蘆

二兩半

蛇蛻

炙十條瓜蒌十箇急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍吃熟羹助之

猪蹄湯澹寮方治外婦氣小力衰脉澁不行紀乳汁

猪蹄

一隻

通草

五錢

右將猪蹄淨洗依食法淨，以用水一斗同通草浸煮得四
五升取汁飲之

聖露散 大全良方 治產後心脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛
大便秘滯悉能治之涼膈散熱乳

人參

白茯苓

甘草各半兩 桔梗炒

川芎

白芷各一兩 當歸二錢半 芍藥七錢半

右咬咀每服四錢水一鐘半煎至七分去滓溫服食後如頭
熱甚大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁少

瞿麥穗

麥門冬去心 王不留行 紫龍骨

川山甲

炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以木梳
左右乳上梳三十下日三服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳意何如

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盃調入字

須臾搽散笑呵呵

一方 治產後陰腫痛

用桃仁去皮尖細研四五次搽之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入龍骨末少許空心連進二服用麻油煎湯

薰洗

一方 治婦人陰冷

用吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎帛裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜証之劑

○廣按產後諸証其源有三曰血虛火動曰敗血妄行曰飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動而為煩燥發熱之類一也血猶水也水之就下性也孟子云今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使在山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗血妄行而為頭暈腹痛之類二也經云少火生氣壯火食氣東垣云火為元氣之賊火與

元氣不兩立一勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血氣火動則補之敗血妄行則散之飲食過傷則消之何患乎不愈哉雖然人之元氣有虛實疾病有淺深治療有難易又不
可一槩論也

子嗣九十七

附諸虛

斷子法

丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏蒼朮台芩防風羌活滑石或導痰湯之類若是怯瘦性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣宜涼血降火或

四物加香附黃芩柴胡養血養陰等藥可宜 東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕出試効方

附脉理

脉訣舉要曰陰搏於下陽別於上血氣和調有子之象手之少陰其脈動甚尺按不絕此為有孕少氣屬心心主血脈腎為胞門脉應於尺或寸脉微閑滑尺數往來流利如雀之啄或診三部浮沉一止或平而虛當問月水婦人有病而無邪脉此孕非病所以不月

附諸方

六味地黃丸

見補損

女金丹

韓飛霞方

白芍藥

當歸

川芎不見火赤石脂白亦可

藁本

人參

白薇

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

白茯苓

玄胡

沒藥

甘草

十五味除石脂沒藥另研外其餘皆以淳酒浸三日烘乾為細末足殼一十五兩

香附子十五兩以水醋浸二日略炒為細末足十五兩

右十六味和合重羅篩過煉蜜丸如彈子大磁銀器封收每取七丸空心雞未鳴時服一九先以薄荷湯或茶濯漱咽候後細嚼以溫酒或白湯送下鹹物乾果壓之服至四十九丸為一劑以茶水調平受胎為度胎中三日一九產後二日一九

有日止盡人事而足育為夫大人為鹵莽諉曰天命予每于
世之乏嗣者惜為

說說丸和劑方治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉一兩半

肉桂去皮五分

當歸洗焙

熟地黄洗焙各一兩白朮一兩半川芎

石斛酒浸炒各一兩

乾姜炮半兩白芍藥

牡丹皮

延胡索各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每五十丸空心溫酒下

烏雞丸

治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸等

疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許開死去毛腸淨用艾
四兩青蒿四兩剉碎納一半在雞腸用酒燻一隻納雞并

餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二寸許煮絕乾取出
去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為細末

南香附去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便
浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二夏一冬四日
取出晒乾

熟地方四兩生地黄三兩懷慶者勿犯鉄當歸酒浸洗三兩

川芎三兩半

白芍藥三兩遼人參三兩柴胡去芦二兩

黃耆

川牛膝去芦二兩

白朮二兩

黃連炒一兩牡丹皮去心二兩

白茯苓去白二兩半

秦艽一兩半鱉甲三兩醋浸炙黃色

知母二兩

貝母二兩

地骨皮一兩乾姜一兩玄胡索一兩

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大每服
五六十丸漸加至七八十丸溫酒下或米飲下亦得忌煎炒辛
辣之物及芫兒菜

○補血新增

附諸方

當歸建中湯和劑方治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸 去芦四兩

肉桂 去皮二兩

甘草 炙二兩

白芍藥 六兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片藥一枚同煎空心熱服
人參養血丸和劑方治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝任
調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩熟乾地黄五兩

當歸去芦二兩

人參去芦

赤芍藥

川芎

蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九丸溫酒米飲任下

六神湯御藥院方治血氣不足肌腠煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸

地黄

芍藥

川芎各一兩

地骨皮

黃芪各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

補中丸全惠方治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃芪

當歸

人參

陳皮各五分

白朮

地黄各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸溫水下

八珍散 瑞竹堂方調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲食

四物湯

四君子湯

右芍分姜三片枣一枚水二盞煎至一盞去滓溫服食前

滋血湯 御萊院方治婦人皮聚色落心肺俱損血脈虛弱月水
過期益氣養血調進飲食

人參

白茯苓去皮川芎

當歸

白芍藥

山藥

黃耆

熟地黃各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

滋血湯 六全良方滋養榮血補婦人諸虛治血氣久冷

當歸

川芎

芍藥

人參

麥門冬

牡丹皮

阿膠各二兩琥珀七錢半另研

酸棗仁炒

官桂

甘草各一及半夏麴一及半

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至八分去滓通口服

食前日三服

烏雞煎丸祕方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸

黃芪各六分生熟地黃

香附子各四兩

茯苓三及

人參

官桂

地骨皮各二兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄築住將黃耆末和炒麴
丸雞頭子大喂雞服生膠而死腸肚洗淨搗毛槌碎骨入煎
藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯研共為細末用
汁打糊丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯下

○斷子法用白麴麴一升无灰酒五升作糊煮至二升半濾去

澤可分作三服候經至前一日晚○○五更及天明各喫一服
經即不一無不字行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病或交
不時四者而已調其經而補其血去其病而節其慾夫如
是則經調血足無病而交有時豈有不妊娠者乎雖然人
之後嗣係乎天命亦或人事未之盡者可不究其心歟

諸病九十八
新編

加減四物湯
治婦人諸病

熟地黃

川芎

芍藥

當歸各等分

右咬咀每服六錢用水一鍾半煎八分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中去血過多加艾葉阿膠

○血崩加生地黄蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩

○血虛腹疼微汗惡風加義官桂

○風虛眩暈加秦艽羌活

○氣虛無力加厚朴陳皮

○發熱心煩不得臥加黃連梔子

○虛寒脉微自汗氣短白利加乾姜附子

○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓

○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細辛

○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄明索川練子

○經水過多加黃芩白朮

○經水澁少加葵花紅花

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實麩炒

○經水暴下加黃芩

○血積塊痛加莪朮三稜官桂乾漆炒

○赤白帶下加香附官桂

○血崩加阿膠艾葉黃連

○產後血暈腹痛加槐花黃連瞿麥殼

○血熱相搏舌乾口渴加栝樓根麥門冬

○大渴引飲加知母石膏

○臍膈秘澁加大黃桃仁

○嘔吐加白朮人參藿香生姜

○虛寒滑泄加官桂附子炮

○虛寒不眠加竹葉人參酸棗仁

○日暴赤作翳障加防風羌活防已酒浸熊膽草

加減四物湯大全良方治妊娠產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜服

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○妊娠下血卽入艾葉六七片阿膠末一錢同煎病勢甚大散藥不及以四味各半兩川水四盞煎至二盞半去滓分

四服食前熱服一日中令盡以上為度

○產乳服至三臈止

○如虛弱血裁不調至一月止

○因虛致熱与血掛口舌乾渴欲飲水者加天花粉一兩

麥門冬七錢半

○腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各二錢半

○血崩如生地黄蒲黃各一兩一

○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢

○身熱脉躁頭昏煩強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩桃仁二錢半炒

○如大黃滑泄加桂心熟附子各二錢半

○發寒振加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半

○嘔者加白朮人參各半兩

○腹脹加厚朴枳實各二錢半

○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半

○煩躁大渴加知母石膏各五錢

○水停心下微吐逆加茯苓茯苓防已各二錢半

○虛寒狀類湯寒加人參桑寄生防風各七錢半

經驗加減四物湯因方大成治婦人諸虛不足

當歸酒浸一宿用身熟地黃白芍藥川芎各一兩

右咬咀為剉散看病證加減後藥前服

○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩

○胎動下血加熟地二兩阿膠末一錢

○補下元加乾姜半兩甘草七錢

○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩

○便血及帶下加荆芥地椒

○血氣滯腹內刺痛加桂

○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩

○血風勞加荆芥柴胡

○潮熱加前胡乾葛人參黃芩

○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢

○產後虛癰血熱煩悶加生地黃

○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

○產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩

○經血淋瀝不斷加乾薑蓮房炒入藥

○血滯不通加紅花桃仁各二錢半

○產後悶亂加茯苓遠志各半兩

○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

○姙娠心腹煩加竹茹一塊

○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以生

者易之

○大便閉加大黃桃仁各二錢干

八物湯聖惠方若經事欲行腹臍絞痛者血澁也宜服

四物湯四錢玄胡索苦練碎炒黑煨榔木香各一兩

○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯

四物湯四兩黃芩白朮各一兩

○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯

四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月不去

黃芩

○若經水如黑豆不著加黃芩黃連各一兩

○若經水少面色紅者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來而斷或久不來寒熱者先服柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加京三稜桂枝各二兩入物湯聖惠方若婦人傷寒汗下後飲食減少無惡寒者宜服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩

○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

○若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎氣令人有子四物湯加縮砂四君子湯各半名八

珍湯

○若熱與血相搏口舌乾渴飲水加栝樓麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臍祕結澁者加大黃桃仁

○若頭昏項強者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡防風

○若嘔者加白朮人參生姜

○若發寒熱者加乾生薑牡丹皮芍藥柴胡

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

○若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

○若產婦諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之其效如神

○若婦人或因傷酒或因生產去血或虛勞五心煩熱者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黃黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲酒
剪服

○廣按婦人外感內傷一切疾病與丈夫同治惟月候孕產
崩漏帶下數証與丈夫異治也夫婦人以血爲海婦人伏
於人者凡事不得專行每多憂思忿怒也醫書云氣行則
血行氣止則血止蓋婦人憂思過度則氣結氣結而血亦
結矣又云氣順則血順氣逆則血逆蓋婦人忿怒過度則
氣逆氣逆則血亦逆矣氣血結逆於臟腑經絡之間所以
婦人多腹脇諸痛內外煩熱也然疼痛煩熱二者不可不
分疼痛者血滯也煩熱者氣滯也血滯以辛溫之劑治之
氣滯以辛涼之劑治之氣血俱滯而疼痛煩熱齊作者又

當以辛平之劑治之。大抵婦人血用事氣行則無病而古
人治婦人之病多用香附縮砂木香檳榔青皮枳殼者行
氣故也。抑嘗論之。凡治婦人之病先問月候緊要以月候
如期爲安。先期而來者血熱也。過期而來者血虛也。或疼
痛或發熱者氣血鬱結也。凡婦人之病多是血氣鬱結故
治婦人之病以開鬱行氣爲主。鬱開氣行而諸病自瘥矣。
煩熱是二意。煩者內煩也。熱者外熱也。



